



Manejo de la medicación

MEDICACIÓN POR VÍA ORAL, PIEL, RECTO o INFUSOR

MEDICACIÓN POR LA PALOMILLA

	Horario de administración					
	8	12	16	20	24	4
mL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
mL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- ❑ Respete el horario de la medicación. De no hacerlo el enfermo puede sufrir innecesariamente. Además, estas descompensaciones suelen ser más difíciles de controlar. Esto es especialmente importante en el caso de que esté tomando MORFINA.
- ❑ Tras la administración de fármacos por la palomilla, introduzca por la misma 0,6ml de suero fisiológico, para empujar el fármaco al interior.
- ❑ Proteja las ampollas de la luz. Cúbralas con papel de aluminio o consérvelas en su envase.
- ❑ Vigile el punto de inyección. Si está rojo o doloroso, o si sale líquido, avísenos.

MEDICACIÓN A EMPLEAR ANTE DESAJUSTES

SI PUEDE TRAGAR

Cada 45 minutos administre la dosis indicada. Puede repetirla hasta 3 veces. Si el problema no cede, póngase en contacto con el médico.

AGITACIÓN _____

NERVIOSISMO _____

FATIGA _____

DOLOR _____

SI NO PUEDE TRAGAR

● Por vía subcutánea

Cada 20-30 minutos administre la dosis indicada por la palomilla. Puede repetirla hasta 3 veces. Si el problema no cede, póngase en contacto con el médico. Recuerde: tras cada administración tiene que inyectar 0,5 mL de suero fisiológico para empujar la medicación hasta el interior.

AGITACIÓN _____

NERVIOSISMO _____

FATIGA _____

DOLOR _____

● Por vía rectal

CONVULSIONES — **STESOLID® 5/10** por el recto. SI NO CEDE: repetir a los 5 minutos

HEMORRAGIA _____

- 1) Póngase guantes y, si puede, haga presión (gasa o algodón) sobre ella
- 2) Ponga toallas de color verde o azul alrededor de la hemorragia
- 3) **STESOLID® 5/10**. Repetir cada 5 minutos hasta adormecer al enfermo