



Manejo de la palomilla (cuadros paliativos)

GENERALIDADES

- ❑ **Advertencias.**
 - Con cada aplicación (fármacos más suero fisiológico) no deberíamos superar los 2ml de volumen total.
 - Cambios de la palomilla.
 - Aunque no haya problemas, cada 4-7 días se cambiará de forma preventiva.
 - Vigile el punto de colocación de la palomilla. Si pierde líquido o está rojo, caliente o edematoso, hay que proceder a su cambio.
 - No aplique ni frío ni calor sobre la zona próxima a la palomilla, ni sobre ella.
- ❑ **Medicación.**
 - Respete los horarios de administración. Cualquier retraso puede suponer una crisis de difícil solución, especialmente en el caso de los analgésicos.
 - Como norma general, las ampollas deben de ser protegidas de la luz. Podemos guardarlas en su caja o, si están a mitad de uso, envolverlas en papel de aluminio.
 - La dexametasona y la metoclopramida no se pueden asociar a otros fármacos. Tienen que ponerse por una palomilla independiente.
- ❑ Su defunción no es una urgencia médica. Cuando ocurra, avise a la funeraria: se encargará de todos los trámites.

PROCEDIMIENTO

- 1) Cargue una jeringa con 0,6 mL de suero fisiológico, que será aplicado tras haber puesto todos los fármacos prescritos para la presente aplicación. A la hora de calcular el volumen de la jeringa, colóquela en vertical para poder purgar el aire que contiene.
- 2) Cargue en jeringas distintas los fármacos que haya que administrar. Si la aplicación no va a ser inmediata, protéjalos de la luz con papel de aluminio.
- 3) Desenrosque el tapón de la boca de la palomilla.
- 4) Acoplar a presión la jeringa sobre la boca de la palomilla.
- 5) Empujar lentamente el émbolo hasta introducir todo el fármaco. Repetir con el resto de jeringas cargadas con el resto de la medicación.
- 6) Tras haber introducido todos los fármacos, inyectar el suero fisiológico (0'6ml) para terminar de empujar todos los fármacos hasta el interior.
- 7) Enroscar el tapón.